

Récolteur : **LAURENT Patrick**

Date : **mardi 24 août 2004** n° de récolte : **026**

Lieu : MARTINIQUE – SAINT ESPRIT – Bois la Charles

Ville, village, lieu-dit...,

Coordonnées UTM

Photo numérique : oui

Ischnoderma sp

BIOTOPE : Sur bois mort décortiqué

Nombre de spécimens : 2

Abondance : **1**: spécimen isolé ; **2**: de 2 à 8 spécimens, groupés ou disséminés (préciser) ; **3**: de 9 à 19 spécimens ; **4**: de 20 à 49 spécimens ; **5**: plus de 50 spécimens

Odeur sur le terrain : Non remarquée



Sur le terrain, la face supérieure de ce champignons m'a fait penser à *Ischnoderma benzoinum*, avec son dégradé et ses zones de couleurs variant du bistre aux bruns.

Basidiome résupiné et/ou en console, de >15 cm de large et >10 cm de projection.

Face supérieure, zonée, ruguleux à striations radiales, les couleurs des zones vont du noir au brun, en passant par du bistre et des dégradés de tons bruns, irrégulières, noire à la marge.

Lames (ou pores) :

Densité, forme, insertion (en coupe), arête, couleur

Les pores sont extrêmement fins, 4 à 5 par mm, ronds, de couleur brun pâle, brun fauve, légèrement moiré, vers la marge ils s'éclaircissent puis la marge est stérile et brun noire.

Les tubes font 2-2,5 mm, couchés en biais (obliques à 45°), concolores aux tubes

Chair :

Épaisseur, consistance, couleur et changement de couleur, odeur, goût

Subéreuse, brune, sans odeur particulière.