

Espèce	ÉCOLOGIE	Statut trophique	Type de Milieu
<i>Calocybe gambosa</i> (Fr. : Fr.) Singer	Sous les mousses, parmi les buis, sous <i>P. nigra</i>	S	Fourré à buis
<i>Marasmius oreades</i> (Bolt. : Fr.) Fr.	Prés non traités, lisières, en rond de sorcière. Pelouse sèche.	S	Pelouse sèche
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers. Fr.)	Saprotrophe sur débris ligneux de feuillus (<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i>)	SL	Bois clair feuillus
<i>Russula cyanoxantha</i> (Sch.) Fr.	Sous <i>Carpinus betulus</i>	ecM	Bois clair feuillus
<i>Phallus impudicus</i> L. : Pers.	Sous <i>Pinus nigra</i>	S	Boisement de pin noir
<i>Pluteus cervinus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Bois très décomposé de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Boisement de pin noir
<i>Hydnum repandum</i> (L. : Fr.)	Sous <i>Carpinus</i> .	ecM	Bois clair feuillus
<i>Laccaria amethystina</i> (Huds.) Cooke	Sous <i>Corylus</i> et <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Bois clair feuillus
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Scop. : Fr.) Smith	Souches et bois de feuillus	SL	Bois clair feuillus
<i>Suillus granulatus</i> (L. : Fr.) Roussel	Sous <i>Pinus nigra</i>	ecM	Pin isolé
<i>Agaricus campestris</i> (L. : Fr)	dans une pelouse sèche, à proximité d'une formation à <i>Buxus sempervirens</i> ,	S	Pelouse sèche
<i>Agaricus silvaticus</i> (Sch. : Fr.)	Sous <i>Pinus nigra</i> .	S	Boisement de pin noir
<i>Laccaria laccata</i> (Scop. : Fr.) Cooke	Forêts, lieux découverts	ecM	Bois clair feuillus
<i>Amanita vaginata</i> (Bull. : Fr.) Vittadini	Sous <i>Betula pendula</i>	ecM	Bois clair feuillus
<i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) S.F. Gray	Sous <i>Populus tremula</i> .	ecM	Bois clair feuillus
<i>Armillaria mellea</i> (Vahl. : Fr.) Kummer	Souches et bois dégradé de <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , charme, chêne.	SP	Bois clair feuillus
<i>Cuphophyllus niveus</i> (Scop. : Fr.) Bon	Dans une pelouse mésophile,	S	Pelouse mésophile
<i>Lyophyllum decastes</i> (Fr. : Fr.) Singer	Sur bois enterré de <i>Pinus nigra</i> , de noisetier	SL	Boisement de pin noir
<i>Cuphophyllus pratensis</i> (Pers. : Fr.) Bon	Pelouse sèche	S	Pelouse sèche
<i>Hygrocybe chlorophana</i> (Fr. : Fr.) Wünsche	Pelouses sèche et pelouse pâturée occasionnellement.	S	Pelouse sèche
<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop. : Fr.) Quélet	Sous <i>Quercus petraea</i> , en bordure de sentier - Dans la pelouse sèche. Sur une souche très dégradée et moussue de charme. Sous <i>Pinus nigra</i> .	S	Bois clair feuillus
<i>Gomphidius rutilus</i> (Sch. : Fr.) O.K. Miller	Sous <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Pin isolé
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull. Fr.) Singer	Dans une pelouse, en lisière d'une ancienne place à feu, saprolignicole sur des débris de bois enterrés. Dans la litière d'aiguilles.	SL	Bois clair feuillus
<i>Lepista nuda</i> (Bull. Fr.) Cooke	En lisière de pinède à <i>Pinus nigra</i> , sous <i>Pinus nigra</i> , saprotrophe dans la litière épaisse.	S	Boisement de pin noir
<i>Lepista nebularis</i> (Batsch : Fr.) Harm. var. <i>nebulosa</i>	Dans une pinède à <i>Pinus nigra</i> , en lisière d'une formation à <i>Buxus sempervirens</i> , dans la litière d'aiguilles.	S	Boisement de pin noir
<i>Lepista personata</i> (Fr. : Fr.) W.G. Smith = <i>saeva</i>	Dans la pelouse sèche, près des massifs de <i>Buxus sempervirens</i> , parfois dedans.	S	Pelouse sèche
<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wülf. : Fr.) Kovalenko	Dans les pelouses sèches - Dans un massif de buis, sur sol affleurant recouvert de petites mousses	S	Pelouse sèche
<i>Schizophyllum commune</i> (Fr. : Fr.)	Souches et troncs de <i>Pinus nigra</i> , souche de <i>Tilia platyphyllos</i> , branchette de <i>Populus tremula</i> , branche d' <i>Acer campestre</i> .	SL	Pin isolé
<i>Tremella mesenterica</i> (Retz. : Fr.)	Sur branche de <i>Prunus spinosa</i> - Sur tige de <i>Rosa canina</i> , branchette de <i>Quercus petraea</i>	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Morchella esculenta</i> var. <i>vulgaris</i> Pers.	Forêts, haies, bosquets, bords chemins, près de <i>Prunus spinosa</i> .	S	Fourré (<i>Prunetalia</i>)

<i>Collybia dryophila</i> (Bull. : Fr.) Kummer	Litière Pinus nigra, Corylus, Crataegus, Quercus, Acer campestre, Buxus	S	Boisement de pin noir
<i>Amanita battarae</i> (Boudier) Bon	Dans une chênaie mais sous <i>Corylus avellana</i> .	ecM	Bois clair feuillus
<i>Boletus luridus</i> (Sch. : Fr.)	Dans la pelouse, sous Pinus nigra, sous Tilia platyphyllos et sous chêne, sous charme	ecM	Pin isolé
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (Sch. : Fr.) Singer	Sur souche de P. nigra.	SL	Pin isolé
<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittadini) Nasser	Pelouses amendées par déjections des moutons.	S	Pelouse amendée
<i>Hygrocybe conica</i> (Scop. : Fr.) Kummer	Pelouses et lieux gramineux	S	Pelouse
<i>Hygrocybe psittacina</i> (Sch. : Fr.) Kummer	Endroits herbeux - Ubiquiste	S	Pelouse
<i>Tricholoma terreum</i> (Sch : Fr.) Kummer	Mychorizique de <i>Pinus nigra</i> , dans la pelouse sommitale, au niveau des racines des pins,	ecM	Pin isolé
<i>Agrocybe praecox</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Sur débris ligneux humides de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Pin isolé
<i>Polyporus ciliatus</i> Fr.	Sur bois mort enterré de Crataegus monogyna, Acer campestre, Tilia platyphyllos	SL	Bois clair feuillus
<i>Polyporus tuberaster</i> (Pers. : Fr.) Fr. = P. lentus	Sur bois mort de <i>Corylus</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Psathyrella candolleana</i> (Fr. : Fr.) Maire	Sur bois mort enterré de <i>Crataegus monogyna</i> . Sur bois mort enterré de feuillu. Sur tronc vivant cortiqué et moussu de <i>Robinia pseudoacacia</i> . Bord chemin herbeux avec débris ligneux. Sur bois mort de Populus tremula.	SL	Bois clair feuillus
<i>Tricholoma sculpturatum</i> (Fr.) Quélet	Sous charmes et noisetiers.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Hypoloma sublateritium</i> (Sch. Fr.) Quélet	Sur bois enterré de feuillu. Souche de Crataegus monogyna.	SL	Bois clair feuillus
<i>Hypoloma fasciculare</i> (Huds. Fr.) Kummer	Sur bois de feuillus enterré - Sur souches de Pinus nigra, de Corylus. Sur tronc mort debout de Crataegus monogyna, à la base d'un tronc de Prunus spinosa. Betula,	SL	Boisement de pin noir
<i>Helvella crispa</i> (Scop. : Fr.) Fr.	Sous <i>Pinus nigra</i> , dans un bois clairs de feuillus mêlé de quelques pins. Sous noisetier.	S	Bois clair feuillus
<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Dans une pelouse sèche, près d'une formation à buis - Dans un bois clair. (frêne, charme, noisetier)	S	Bois clair feuillus
<i>Marasmius rotula</i> (Scop. : Fr.) Fr	Sur débris divers (brindilles.....)	SL	Bois clair feuillus
<i>Oudemansiella radicata</i> (Rehl. : Fr.) Singer	Sur racines mortes de charme. Dans le centre pourrissant d'une souche de noisetier.	SL	Bois clair feuillus
<i>Collybia butyracea</i> (Bull. : Fr.) Kummer	Dans la litière	S	Bois clair feuillus
<i>Mycena pura</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Sous Pinus nigra, dans un ourlet forestier, parmi Brachypodium pinatum et Cornus sanguinea. Sous Corylus.	S	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Helvella elastica</i> (Bull. : Fr.)	Sous charme et sous noisetier, avec buis en sous-étage.	S	Bois clair feuillus
<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr. : Fr.) Murrill	Sur brindilles ou branches mortes de Pinus nigra au sol	SL	Boisement de pin noir
<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.) Fayod	En lisière, dans les aiguilles de Pinus nigra, près de buis -	S	Boisement de pin noir
<i>Lepista panaeola</i> (Fr.) Karsten	Dans les pelouses, en lisière de pinède, souvent en lignes sinueuses. - Près de buis.	S	Pelouse sèche
<i>Trametes versicolor</i> (L. : Fr.) Lloyd	Sur bois mort cortiqué de <i>Carpinus betulus</i> , sur racine apparente de <i>Pinus nigra</i> , sur souche de <i>Corylus avellana</i> , sur <i>Prunus spinosa</i> ,	SL	Bois clair feuillus
<i>Calvatia excipuliformis</i> (Sch. : Pers.) Perdeck	En lisière de pinède, sous <i>Pinus nigra</i> .	S	Boisement de pin noir
<i>Coprinus micaceus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Sur débris ligneux de bouleau, noisetier, aubépine, souche de <i>Robinia pseudoacacia</i>).	SL	Bois clair feuillus
<i>Xylaria hypoxylon</i> (L.:Fr.) Greville	Sur <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Lepiota cristata</i> (Alb. & Scw. : Fr.) Kummer	Dans les pelouses, sous <i>Pinus Sylvestris</i> et <i>Pinus nigra</i> (10 à 49) - Dans la litière de buis.	S	Pelouse sèche

<i>Russula sanguinaria</i> (Schum.) S. Rauschert	Sous <i>Pinus nigra</i>	ecM	Boisement de pin noir
<i>Lycoperdon perlatum</i> (Pers. : Pers.)	En lisière de pinède, sous <i>Pinus nigra</i> . Aussi sous chêne.	S	Boisement de pin noir
<i>Lactarius pyrogalus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Sous noisetiers	ecM	Bois clair feuillus
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Vahl : Fr.) S.F Gray	Sous noisetier.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Cortinarius multiformis</i> (Fr.) Fr	Sous <i>Populus tremula</i> , parmi les buis. Sous charme	ecM	Bois clair feuillus
<i>Collybia butyracea</i> var. <i>asema</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Sous <i>Pinus nigra</i> .	S	Boisement de pin noir
<i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull. : Fr) Quélet	Dans un taillis, sous <i>Corylus avellana</i> - Sous <i>Pinus nigra</i> -	ecM	Bois clair feuillus
<i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Sous <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Ganoderma lipsiense</i> (Batsh) Atk.	<i>petraea</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Lenzites betulinus</i> (L. : Fr.) Fr.	Sur branche tombée au sol et bois coupé et empilé de <i>Betula pendula</i> , dans une clairière.	SL	Bois clair feuillus
<i>Phlebia merismoides</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Sur tronçons coupés de <i>Betula pendula</i>	SL	Bois clair feuillus
<i>Bjerkandera adusta</i> (Willd. : Fr.) Karsten	Sur <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Quercus petraea</i> , <i>Pinus nigra</i> mort debout, s ur piquet en <i>Robinia pseudoacacia</i> , bois mort de <i>Carpinus betulus</i> , de <i>Crataegus monogyna</i>	SL	Bois clair feuillus
<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad. : Fr.) Donk	Sur branche morte de <i>Carpinus betulus</i> et <i>Quercus petraea</i> tombées au sol.	SL	Bois clair feuillus
<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) P. Karst.	Sur bois coupé de <i>Betula pendula</i> , sur une pile de bois.	SL	Bois clair feuillus
<i>Fomitopsis pinicola</i> (Schwartz : Fr.) Karsten	Sur une branche morte cortiquée tombée au sol de <i>Pinus nigra</i> . A 5 m de hauteur, sur <i>P. nigra</i> .	SL	Boisement de pin noir
<i>Exidia glandulosa</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Sur bois mort cortiqué de <i>Quercus petraea</i> encore debout. Sur <i>Coryllus avellana</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Peniophora quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke	Sur branches mortes de <i>Quercus</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers. : Fr.) Singer	Sur cônes de <i>Pinus nigra</i> enfouis dans la litière d'aiguilles et d'écorces.	S	Boisement de pin noir
<i>Panellus stypticus</i> (Bull. : Fr.) Karsten	Sur bois de <i>Quercus petraea</i>	SL	Bois clair feuillus
<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers. : Fr.) S .F. Gray	Sur débris ligneux de feuillus.	SL	Bois clair feuillus
<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt. : Fr.) Fr.	Dans pelouses et prairies, litière de <i>Corylus</i> , de <i>Crataegus monogyna</i> .	S	Pelouse
<i>Mycena galericulata</i> (Scop. : Fr.) S. F. Gray	Sur souches de noisetier.	SL	Bois clair feuillus
<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Sur une ramille de <i>Pinus nigra</i> . Sur un tronc mort de <i>Populus tremula</i> . Sur branches mortes de <i>Crataegus monogyna</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Inocybe rimosa</i> (Bull. : Fr.) Kummer	Sous <i>P. nigra</i>	ecM	Boisement de pin noir
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolt. : Fr.) Schroet.	Sur bois mort cortiqué de <i>Prunus padus</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Bovista plumbea</i> Pers. Pers.	Dans l'herbe.	S	Pelouse
<i>Vascellum pratense</i> (Pers. : Pers.) Kreisel	Dans une prairie amendée naturellement. Pelouse sèche.	S	Prairie amendée naturellemen
<i>Lycoperdon piriforme</i> Sch. : Pers.	Sur souches et bois pourri de <i>Corylus</i> , de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Marasmius ramealis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Sur racines et souches.	SL	Fourré
<i>Lycoperdon foetidum</i> Bonard.	Sous <i>Pinus nigra</i> , près de la corniche sommitale.	S	Boisement de pin noir
<i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull. : Fr.) Patouill	Dans une pelouse sèche.	S	Pelouse sèche
<i>Clitocybe dealbata</i> (Sow. : Fr.) Kummer	Dans les pelouses. Pelouse avec excréments des bovins	S	Pelouse

<i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Dans un bosquet.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Oligoporus stypticus</i> (Pers. : Fr.) Gilbn. & Ryv.	Sur bois mort décortiqué de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Boisement de pin noir
<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen) Pilát	Sur bois mort de <i>Quercus petraea</i> et de <i>Prunus avium</i> . Sur souche de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Cystolepiota bucknallii</i> (Berk. & Br.) Singer & C	Sur un chemin de débardage, dans la pinède à <i>Pinus nigra</i> .	S	Boisement de pin noir
<i>Scleroderma areolatum</i> Ehrenb	Près du Sabot, sur la roche recouverte de mousses, en lisière de pinède à <i>Pinus nigra</i> .	S	Boisement de pin noir
<i>Mycena inclinata</i> (Fr.) Quélet	Cespiteux sur bois mort de feuillus.	SL	Bois clair feuillus
<i>Trametes gibbosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Sur souche pourrissante de <i>Tilia platyphyllos</i> , de <i>Carpinus betulus</i> - Sur souche de <i>Quercus</i>	SL	Bois clair feuillus
<i>Phellinus tuberculatus</i> (Baumg.) Niemelä	Sur un tronc vivant de <i>Prunus spinosa</i> .	P	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Mycena filipes</i> (Bull. : Fr.) Kummer	Dans une formation à buis, sous un charme, sur débris végétaux - Sur bois très dégradé de <i>Corylus</i> . Sous un chêne.	S	Bois clair feuillus
<i>Hypoxylon fragiforme</i> (Pers. : Fr.) Kickx	Sur branche morte cortiquée de hêtre.	SL	Bois clair feuillus
<i>Lactarius rufus</i> (Scop. : Fr.) Fr.	Sous <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Mycena polygramma</i> (Bull. : Fr.) S. F. Gray	Sous <i>Corylus</i> . Sur souche de noisetier très décomposée.	SL	Bois clair feuillus
<i>Clavulina cristata</i> (L. : Fr.) Schraeter	En lisière de pinède, parmi les mousses, près de buis.	S	Boisement de pin noir
<i>Clitocybe odora</i> (Bull. : Fr.) Kummer	En lisière d'un bosquet de noisetiers.	S	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Inocybe geophylla</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Lié à <i>Pinus nigra</i> - Lié à un noisetier.	ecM	Boisement de pin noir
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i> (PK.) Gill.	Sous <i>Corylus</i> , <i>Buxus sempervirens</i> et <i>P. nigra</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Hygrophorus chrysodon</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Lié à <i>Tilia platyphyllos</i> .	ecM	Bois clair feuillus
<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet) Gillet	Sous <i>Pinus nigra</i> , <i>Quercus</i> , <i>Corylus</i> , <i>P. sylvestris</i> ., charme, <i>Tilia platyphyllos</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Entoloma prunuloides</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Dans la pelouse sèche.	S	Pelouse sèche
<i>Exidia thuretiana</i> (Lév.) Fr.	Sur branches tombées de <i>Prunus spinosa</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Entoloma clypeatum</i> (L.) Kummer	Le long d'une haies de <i>Crataegus monogyna</i> .	Symbiose	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Lycogala epidendron</i> Linn.	Sur bois mort de <i>Pinus nigra</i> (arbres morts couchés, souches)	S	Boisement de pin noir
<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Sur bois mort cortiqué de <i>Corylus</i> encore debout. Sur bois mort de <i>Populus tremula</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Dacrymyces stillatus</i> Ness. : Fr.	Sur bois mort de <i>Viburnum lantana</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Collybia confluens</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Dans la litière, sous <i>Corylus</i> .	S	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Lactarius camphoratus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Sous <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Skeletocutis nivea</i> (Jungh.) Kell.	Sur branches mortes de <i>Corylus avellana</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Leotia lubrica</i> (Scop. : Fr.) Pers.	Dans une buxaie, sous <i>Corylus</i> et <i>Buxus</i> .	S	Fourré à buis
<i>Russula fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Sous <i>Populus tremula</i> .	ecM	Bois clair feuillus
<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers. : Fr.) Murrill	Dans la pelouse sèche, parfois sous <i>P. sylvestris</i>	S	
<i>Vuilleminia comedens</i> (Nees : Fr.) Maire	Saprolignicole sur branches de <i>Quercus petraea</i> et <i>Quercus X streimi</i>	SL	Bois clair feuillus
<i>Entoloma lividoalbum</i> (Kühn. & Romagn.) Kub	Sous feuillus.	S	Bois clair feuillus

<i>Russula integra</i> (L.) Fr.	Sous <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Agaricus xanthoderma</i> Gévelier	Dans les pelouses sur sol sec, calcaire, jusqu'en lisière des buis ou des pins (10 à 49)	S	Pelouse sèche
<i>Trametes pubescens</i> (Schum. : Fr.) Pil.	Sur bois mort de charme.	SL	Bois clair feuillus
<i>Antrodia albida</i> (Fr.) Donk	Sur branchette morte de noisetier.	SL	Bois clair feuillus
<i>Diatrype stigma</i> (Hoffm. ex Fr.) Fr.	Sur une branche morte cortiquée de <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Carpinus betulus</i> , Q	SL	Bois clair feuillus
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Bull.) Wettstein	Sur troncs dépérissants de <i>Sambucus nigra</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Robinia</i>	SL	Bois clair feuillus
<i>Diatrype bullata</i> (Hoffm. ex Fr.) Tul.	Sur branche morte et cortiquée de <i>Quercus petraea</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Mycena arcangeliana</i> Bresadola	Sur débris ligneux de <i>Crataegus monogyna</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Tubifera ferruginea</i> (Batsch) Gmelin	Sur souche de <i>Pinus nigra</i> .	S	Boisement de pin noir
<i>Amanita lividopallescens</i> (Gillet) Gilbert & Kühn	Associé à un noisetier, dans un bois clair de feuillus mêlés de quelques <i>Pinus nigra</i>	ecM	Bois clair feuillus
<i>Tricholoma ustaloides</i> Romagnesi	Sous charmes.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Mycena aetites</i> (Fr.) Quélet	Dans la pelouse, sous <i>P. nigra</i> .	S	Dans pelouse sèche
<i>Inocybe tigrina</i> Heim	Sous <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Merulius tremellosus</i> Schrad. : Fr.	Sur un tronc mort debout de <i>Populus tremula</i> . Sur bois dégradé (chantier 2004)	SL	Bois clair feuillus
<i>Pluteus salicinus</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Sur souches de <i>Corylus</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Lepiota pseudohelveola</i> Kühner ex Hora	Dans l'humus de la pelouse sèche sommitale, en lisière de pinède	S	Pelouse sèche sommitale
<i>Tephrocybe rancida</i> (Fr. : Fr.) Donk	Sous <i>P. nigra</i>	S	Boisement de pin noir
<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Sous <i>P. sylvestris</i> , au milieu des massifs de buis	ecM	Pin isolé
<i>Granulobasidium vellereum</i> (Ell. & Craq.) Jül.	Sur branchette morte décortiquée de <i>Crataegus monogyna</i> tombée au sol.	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Pulcherricium caeruleum</i> (Fr.) Parm.	Sur bois mort d ' <i>Euonymus europaeus</i> , dans une haie. De <i>Corylus avellana</i> , dans une haie. De <i>Crataegus monogyna</i> , dans un sous-bois. De <i>Robinia pseudoacacia</i> au bord d'un chemin.	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Plicaturopsis crispa</i> (Pers. : Fr.) Reid.	Sur <i>Prunus spinosa</i> et <i>Corylus</i> secs sur pied.	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Baeospora myosura</i> (Fr. : Fr.) Singer	Greffé sur cône de <i>P. nigra</i> enfoui.	S	Boisement de pin noir
<i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schw. : Fr.) F	Sur bois mort de <i>Pinus nigra</i>	SL	Boisement de pin noir
<i>Trametes multicolor</i> (Schaeff.) Jül.	Sur bois mort de <i>Quercus petraea</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Acc</i>	SL	Bois clair feuillus
<i>Stereum ochraceo-fulvum</i> (Sch.) Ellis	Sur branchette mortes de chêne, de <i>Corylus avellana</i>	SL	Bois clair feuillus
<i>Lyomyces sambuci</i> (Pers. : Fr.) Karst.	Sur bois mort de <i>Sambucus nigra</i> et de <i>Crataegus monogyna</i> tenant encore à l'arbre.	SL	Bois clair feuillus
<i>Phellinus punctatus</i> (Fr.) Pilat	Sur bois mort cortiqué, parfois encore debout, de <i>Corylus</i> , <i>Crataegus</i> , <i>Carpinus</i>	SL	Bois clair feuillus
<i>Gloeophyllum saepiarium</i> (Wulf. : Fr.) P. Karst.	Sur souches ou branches de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Boisement de pin noir
<i>Trichaptum abietinum</i> (Pers. : Fr.) Ryvarden	Sur bois mort de <i>Pinus nigra</i> et <i>sylvestris</i>	SL	Boisement de pin noir
<i>Morchella rotunda</i> (Pers. : Fr.) Boudier	Près d'une haie de prunelliers, dans la pelouse moussue.	S	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Disciotis venosa</i> (Pers. : Fr.) Arnault	Sur un chemin de coupe, sous <i>Buxus sempervirens</i> et <i>Craegus monogyna</i>	S	Fourré à buis
<i>Abortiporus biennis</i> (Bull. : Fr.) Singer	Au sol, sur souche enfouie.	SL	Bois clair feuillus

<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> (Lüll.) Macbr.	Sur bois pourri de <i>Pinus nigra</i>	S	Boisement de pin noir
<i>Crinipellis scabella</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Murril	Greffé sur tiges sèches de <i>Teucrium chamaedrys</i> . Sur chaumes de graminées, dans la pelouse sèche	S	Pelouse sèche
<i>Marasmiellus candidus</i> (Bolt.) Singer	Sur rameaux tombés. En groupes.	SL	Berberidion
<i>Psathyrella marcescibilis</i> (Britz.) Singer	En lisière d'une formation à <i>Buxus sempervirens</i> , parmi les mousses. Dans une pelouse sèche	S	Pelouse sèche
<i>Cortinarius largus</i> Fr.	Sous charme.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Russula maculata</i> Quélet & Roze	Sous <i>Quercus robur</i> .	ecM	Fourré à buis
<i>Mycena olivaceomarginata</i> (Mass.) Mass.	Dans les pelouses moussues.	S	Pelouse moussue
<i>Lycoperdon mammiforme</i> Pers. : Pers.	Dans la pelouse sèche	S	Pelouse sèche
<i>Pholiota highlandensis</i> (Peck) Smith	Dans la pelouse, sur une ancienne place à feu, sur des morceaux de charbon de bois.	S	Place à feu
<i>Mycena flavoalba</i> (Fr.) Quélet	Dans l'herbe au bord d'un chemin, en lisière d'un bosquet de noisetiers.	S	Pelouse
<i>Clitocybe phaeophthalma</i> (Pers.) Kuyper	Sous <i>Pinus nigra</i> isolé dans un bois clair de feuillus, dans la litière d'aiguilles	S	Bois clair feuillus
<i>Galerina marginata</i> (Batsch) Kühner	Sur bois mort de <i>Prunus spinosa</i> et de <i>P. nigra</i>	SL	Bois clair feuillus
<i>Psathyrella microrrhiza</i> (Lasch : Fr.) Konr. & M	Souvent sur débris ligneux enterrés, en lisière d'un bosquet de noisetiers.	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Conocybe subovalis</i> (Kühn.) ex Kühn. & Watl.	En lisières d'un buisson de <i>Corylus</i> .	S	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Stropharia coronilla</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Dans la pelouse sèche rase. Dans les pelouses amendées par excréments de bovins.	S	Pelouse sèche
<i>Hygrocybe ceracea</i> (Wülf. : Fr.) Kummer	Dans la pelouse sèche	S	Pelouse sèche
<i>Tricholoma equestre</i> (L. : Fr.) Kummer	Lié à <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Clitocybe vibecina</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Dans un taillis.	S	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Stropharia caerulea</i> Kreisel	Dans une pelouse rudéralisée, pâturée par les moutons. En lisière d'un buisson, sous <i>Corylus</i> .	S	Pelouse rudéralisée
<i>Lasiosphaeria spermoides</i> (Hoffm. ex Fr.) Ces.	Sur bois mort de buis, dans une buxaie âgée.	SL	Fourré à buis
<i>Tricholoma fracticum</i> (Batsch) Kreisel	Sous <i>Pinus nigra</i> , dans la zone de pelouses sèches exposée au sud.	ecM	Pin isolé
<i>Echinoderma asperum</i> (Pers. : Fr.) Bon	Dans l'herbe, sous <i>P. nigra</i>	S	Pin isolé
<i>Cortinarius suillus</i> Fr. ss. Lange non ss. Joachin	Dans les bosquets de feuillus, sous noisetier et chêne.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Cortinarius anomalus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Sous charme	ecM	Bois clair feuillus
<i>Cortinarius lividoviolaceus</i> (R. Hry. ex Mos.) M	Sous chênes et sous charmes dans une buxaie mêlée de feuillus.	ecM	Buxaie mêlée de feuillus
<i>Paxillus panuoides</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Sur souche dégradée de <i>P. nigra</i>	SL	Pin isolé
<i>Tubercularia vulgaris</i> Tode ex Fr.	Sur rameau sec de <i>Viburnum lantana</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Morchella conica</i> Pers.	En périphérie de places à feu.	S	Place à feu
<i>Peniophora polygonia</i> (Fr.) Bourd. & Galz.	Sur bois mort de <i>Populus tremula</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Marasmius collinus</i> (Scop. : Fr.) Sing.	Dans une pelouse à <i>Bromus erectus</i> sur sol sec, calcaire, superficiel, thermophile.	S	Pelouse à bromus erectus
<i>Suillus collinitus</i> (Fr.) O. Kuntze	Sous <i>Pinus nigra</i> - Plutôt calcicole.	ecM	Pin isolé
<i>Stropharia pseudocyanea</i> (Desm. : Fr.) Morgan	Dans la pelouse sèche	S	Pelouse sèche
<i>Boletus radicans</i> Pers. : Fr.	Sous chêne.	ecM	Bois clair feuillus

<i>Lactarius fulvissimus</i> Romagnesi	Mycorhizique de <i>Quercus streimi</i>	ecM	Bois clair feuillus
<i>Lactarius zonarius</i> (Bull.) Fr.	Dans l'herbe , sous <i>Populus nigra</i> . Sous <i>Populus tremula</i> , sous charme.	ecM	Pin isolé
<i>Cortinarius infractus</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Mycorhizique de <i>Quercus robur</i> - de <i>Tilia platyphyllos</i>	ecM	Bois clair feuillus
<i>Entoloma sericeum</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Dans les pelouses, les prairies.	S	Pelouse
<i>Postia fragilis</i> (Fr.) Jül.	Sur fût mort de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Meruliopsis corium</i> (Pers. : Fr.) Ginns	Sur bois dégradé de feuillu.	SL	Bois clair feuillus
<i>Phellinus ferruginosus</i> (Schrad. : Fr.) Pat.	Sur une branche morte de <i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer campestre</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus mono</i>	SL	Bois clair feuillus
<i>Skeletocutis nivea</i> (Jung.) Keller f. <i>resupinatus</i>	Sur bois mort de noisetier.	SL	Bois clair feuillus
<i>Diatrypella quercina</i> (Pers. ex Fr.) Cke	Sur branches mortes et cortiquées de <i>Quercus robur</i> - et <i>petraea</i>	SL	Bois clair feuillus
<i>Entoloma hebes</i> (Romagnesi) Trimbach	En lisière des massifs de buis ou dans les massifs de buis situés dans les pelouses sèches.	S	Fourré à buis
<i>Peniophora cinerea</i> (Fr.) Cooke	Sur branche morte d' <i>Acer campestre</i> , de <i>Cornus sanguinea</i> , de <i>Euonymus europeus</i> , de <i>Crataegus</i>	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Phylloporia ribis</i> (Schumach.) Ryvarden f. <i>evonymi</i>	Sur tronc vivant de <i>Evonymus europaeus</i> , vers la base.	P	Bois clair feuillus
<i>Sebacina laciniata</i> (Bulliard) Bresadola	Sur litière de feuilles de buis	S	Fourré à buis
<i>Delicatula integrella</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Sur le sol ou sur des débris végétaux, dans des endroits humides.	S	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Coprinus gonophyllus</i> Quélet.	Sur une place à feu recouverte de funaie (<i>Funaria hygrometrica</i>).	S	Place à feu
<i>Lactarius semisanguifluus</i> Heim & Leclair	Sous <i>Pinus sylvestris</i> et <i>Pinus nigra</i> - Thermophile, subméditerranéen, spécialiste de la combinaison	ecM	Pin isolé
<i>Lepiota rhacodes</i> var. <i>bohemica</i> (Wich.) Bell.&	rudéralisé.	S	Bois clair feuillus
<i>Inocybe piriodora</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Sous chêne.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Macrocyttidia cucumis</i> (Pers. : Fr.) Jossierand	Sous <i>P. nigra</i> , dans une zone relativement fraîche.	S	Boisement de pin noir
<i>Hygrocybe quieta</i> (Kühner) Singer	En bordure de chemin, en lisière d'un buisson de buis.	S	Fourré à buis
<i>Cuphophyllus colemannianus</i> (Bloxam) Bon	Dans la pelouse sèche, sous <i>Tilia platyphyllos</i> .	S	Pelouse sèche
<i>Coprinus lagopides</i> P. Karsten	Sur charbonnière de 2008	S	Place à feu
<i>Lycoperdon molle</i> Pers. : Pers.	Dans la pelouse sèche	S	Pelouse sèche
<i>Galerina pumila</i> (Pers. : Fr.) Lange	Sur la terre moussue, en lisière d'une formation de feuillus et de <i>Buxus sempervirens</i>	S	Bois clair feuillus
<i>Clavulinopsis corniculata</i> (Sch. : Fr.) Corn.	Dans les pelouses ou les taillis de feuillus, de préférence sur sols moussus.	S	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Antrodia serialis</i> (Fr.) Donk	Sur branche morte tombée au sol de <i>P. nigra</i> . Sur cime cassée de <i>P. nigra</i> ne touchant pas le sol.	SL	Boisement de pin noir
<i>Cortinarius subelegantiior</i> Hry	Sous <i>Tilia platyphyllos</i> .	ecM	Bois clair feuillus
<i>Erysiphe trifolii</i> Grev.	Parasite sur <i>Trifolium medium</i> , <i>Melilotus albus</i>	P	
<i>Sawadaea bicornis</i> (Wallr. : Fr.) Homma.	Parasite sur <i>Acer campestre</i> .	P	Bois clair feuillus
<i>Inocybe bongardii</i> (Weinm.) Quélet	Sous feuillus. Sous <i>Populus tremula</i> .	ecM	Bois clair feuillus
<i>Geastrum sessile</i> (Sow.) Pouzar	Sous <i>Pinus nigra</i> .	S	Bois clair feuillus
<i>Clavulinopsis helvola</i> (L. : Fr.) Corner	Dans une clairière, dans une zone moussue	S	Bois clair feuillus
<i>Hebeloma hiemale</i> Bresadola	Sur roche affleurante non loin du Sabot, sous <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Sur roche affleurante

<i>Tulostoma brumale</i> (Pers. : Pers.)	En bordure de corniche, dans une zone sans humus. (récolté le 23/05/1993) - Pré pâturé	S	Bord corniche
<i>Hypoholoma fasciculare</i> f. <i>pusillum</i> (Lge.)	Sur souche dégradée	SL	Bois clair feuillus
<i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr. : Fr.) Wünsche	Dans une buxaie avec <i>Populus tremula</i> , dans les pelouses ou en lisière de bosquet.	S	Fourré à buis
<i>Psathyrella multipedata</i> (Peck) Smith	Dans une zone de carex, dans un zone herbeuse entre deux bois de <i>Pinus nigra</i> .	S	Zone de carex
<i>Hygrocybe pseudoconica</i> Lange = <i>H. nigrescens</i>	Dans la pelouse sèche.	S	Pelouse sèche
<i>Sebacina incrustans</i> (Pers. : Fr.) Tulasne	Sur l'écorce de troncs vivants de charmes et de buis	SL	Fourré à buis
<i>Cortinarius duracinus</i> Fr.	Dans une buxaie avec <i>Corylus</i> , sous noisetiers et buis.	ecM	Fourré à buis
<i>Agaricus squamulifer</i> (Moeller) Pilat	Dans la pelouses sèche, en lisière d'un massif de buis.	S	Pelouse sèche
<i>Mycena vulgaris</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Sous <i>Pinus nigra</i> , dans les aiguilles.	S	Boisement de pin noir
<i>Corticium roseum</i> Pers.	Sur tige morte de <i>Rosa canina</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Lepiota castanea</i> Quélet	Dans un taillis	S	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Mycena mucor</i> (Batsch : Fr.) Gill.	Sur feuilles mortes de charme, dans une formation à buis jouxtant un charme.	S	Fourré à buis
<i>Peniophora limitata</i> (Chaillat ex Fr.)	Sur bois mort de <i>Fraxinus excelsior</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Micromphale perforans</i> (Hoffm. : Fr.) Sing.	Greffé sur aiguilles de <i>P. nigra</i>	S	Boisement de pin noir
<i>Lophodermium juniperinum</i> (Fr.)	Sur aiguilles mortes de <i>Juniperus communis</i> .	S	Juniperus dans pelouse
<i>Hypoxylon fuscum</i> (Pers. ex Fr.) Fr.	Sur bois mort cortiqué au sol ou encore debout de <i>Corylus</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Mycena vitrea</i> (Fr.) Quélet.	Sous feuillus dans la litière.	S	Bois clair feuillus
<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. Apud. Gmelin)	Sur bois mort de <i>Corylus avellana</i> et de <i>Carpinus betulus</i> , d'un chêne	SL	Bois clair feuillus
<i>Gymnosporangium sabinae</i> Wint.	Parasite sur <i>Pyrus communis</i> .	P	Bois clair feuillus
<i>Lyophyllum immudum</i> (Berkeley) Kühner	Dans l'herbe, sous un charme.	S	Bois clair feuillus
<i>Lactarius deliciosus</i> (L. : Fr.) S.F. Gray	Sous <i>Pinus nigra</i> , dans l'herbe,	ecM	Pin isolé
<i>Hygrocybe fornicata</i> var. <i>streptopus</i> (Fr.) Arn.	Sous <i>buxus sempervirens</i> , parmi les mousses	S	Fourré à buis
<i>Hygrocybe euroflavescens</i> Kühner	Dans les pelouses, les prairies.	S	Pelouse sèche
<i>Mycena galopus</i> (pers. : Fr.) Kummer	Sous <i>Pinus nigra</i> , dans la litière d'aiguilles. Litière de feuilles de <i>Corylus</i> , <i>Carpinus</i> .	S	Boisement de pin noir
<i>Gloeophyllum abietinum</i> (Fr.) Fr.	Sur souche de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Pin isolé
<i>Phragmidium bulbosum</i> (Strauss) Schlecht	Parasite sur <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	P	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Phragmidium mucronatum</i> (Pers.) Schlecht	Parasite sur feuilles de <i>Rosa canina</i> .	P	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Phyllactinia guttata</i> (Wallr. ex Schlecht) Lév.	Parasite sur <i>Viburnum lantana</i> .	P	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Phyllactinia fraxini</i> (D.C.) Homma	Parasite sur <i>Fraxinus excelsior</i>	P	Bois clair feuillus
<i>Auriscalpium vulgare</i> S.F. Gray	Sur cônes de <i>Pinus nigra</i> enfoui dans le sol.	S	Boisement de pin noir
<i>Marasmius buxi</i> Fr. in Quélet.	Saprotrophe sur feuilles mortes de <i>Buxus</i> .	S	Fourré à buis
<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Sous <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Hypoxylon multiforme</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Sur branches mortes cortiquées de <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Carpinus betulus</i> .	SL	Bois clair feuillus

<i>Erysiphe sordida</i> Junell	Parasite sur <i>Plantago lanceolata</i> .	P	
<i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Saprolignicole sur souche de <i>Pinus nigra</i> très décomposée - Sur racine d'une souche de <i>Pinus n</i>	SL	Boisement de pin noir
<i>Erysiphe aquilegiae</i> var. <i>ranunculi</i> (Grev.) R.Y	Parasite sur <i>Ranunculus bulbosus</i> .	P	
<i>Microsphaera alphitoides</i> Griff. & Maubl.var. <i>a</i>	Parasite sur <i>Quercus x streimi</i>	P	Bord corniche
<i>Phragmidium violaceum</i> (Schultz.) Wint.	Parasite sur <i>Rubus fruticosus agr.</i>	P	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Thedgonia ligustri</i> (Boerema) Sutton	Parasite sur <i>Ligustrum vulgare</i> .	P	
<i>Lactarius sanguifluus</i> (Paulet : Fr.) Fr.	Sous <i>Pinus nigra</i> dans une zone thermophile. Sous <i>P. sylvestris</i> .	ecM	Pin isolé
<i>Clitocybe metachroa</i> (Hall. : Fr.) Kumm.	Dans la litière d'aiguilles et les tapis de mousses, sous <i>P. nigra</i> .	S	Pin isolé
<i>Junghunia separabilima</i> (Pouz.) Ryv.	Sur bois mort de <i>Carpinus betulus</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Septoria cornicola</i> Desm.	Parasite sur feuilles de <i>Cornus sanguinea</i>	P	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Phyllosticta variegata</i> Ell. & Ev.	Parasite sur <i>Fraxinus excelsior</i>	P	Bois clair feuillus
<i>Phyllosticta buxina</i> Sacc.	Parasite sur <i>Buxus</i> .	P	Fourré à buis
<i>Pseudonectria rousseliana</i> (Mont.) Wollenw.	Sur feuilles mortes de <i>Buxus</i> .	SP	Fourré à buis
<i>Boletus depilatus</i> Redeuilh	Sous charmes, bois clair de feuillus.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Melampsora rostrupii</i> Wagner ex Kleb.	Parasite sur <i>Populustremula</i>	P	Bois clair feuillus
<i>Hypoxilon serpens</i> (Pers. : Fr.) Kicks	Sur bois mort dégradé de <i>Fraxinus excelsior</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Septoria hedericola</i> (Fr.) Jorst.	Parasite sur feuilles de <i>Hedera Helix</i> .	P	Bois clair feuillus
<i>Russula delica</i> Fr.	Sous noisetier.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd. : Fr.) Fr.	Sur bois mort cortiqué encore debout de <i>Corylus avellana</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Quercus X streimi</i> , <i>Quercus petraea</i> , <i>Prunus spinosa</i> . Sur charme vivant blessé.	SL	Bois clair feuillus (5A et 5B)
<i>Haematostereum rugosum</i> (Pers. : Fr.) Pouz.	Sur bois mort de <i>Coryllus</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Puccinia buxi</i> D.C.	Parasite sur feuilles de <i>Buxus</i> .	P	Fourré à buis
<i>Langermania gigantea</i> (Batsch : Pers.) Roskov.	Dans un bois clair gramineux peuplé de Robiniers et de buis - Dans la pelouse sommitale -	S	Bois clair feuillus
<i>Ustilago maydis</i> (DC.) Cda.	Parasite sur inflorescence de maïs.	P	Culture
<i>Vuilleminia coryli</i> Boid. Lanq. & Gilles	Sur bois mort de <i>Corylus</i> encore debout.	SL	Bois clair feuillus
<i>Septoria rubi</i> West	Parasite sur <i>Rubus fruticosus agr.</i>	P	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quélet	Sous <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Pin isolé
<i>Russula amara</i> Kucera	Sous les <i>Pinus nigra</i>	ecM	Boisement de pin noir
<i>Entoloma incanum</i> (Fr. : Fr.) Hesler	Dans la pelouse sèche exposée au sud.	S	Pelouse sèche
<i>Mycena aurantiomarginata</i> (Fr.:Fr.) Quélet	Sur tapis d'aiguilles de <i>Pinus nigra</i> .	S	Boisement de pin noir
<i>Inocybe fuscidula</i> Velen.	Sous <i>P. nigra</i> , près de la corniche, sur sol caillouteux.	ecM	Boisement de pin noir
<i>Stropharia ochrocyanea</i> Bon	Dans une pelouse sèche fauchée.	S	Pelouse sèche fauchée
<i>Cortinarius decipiens</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Dans un bosquet de feuillus, sous <i>Populus tremula</i> .	ecM	Bois clair feuillus

<i>Puccinia allii</i> Castagne	Parasite sur <i>Allium sphaerocephalon</i>	P	
<i>Melasmia acerina</i> Lév.	Parasite sur <i>Acer pseudoplatanus</i>	P	Arbre isolé dans pelouse
<i>Inocybe nitidiuscula</i> (Britz.) Saccardo	Sous <i>Pinus nigra</i> , <i>Carpinus</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Inonotus rheades</i> (Pers.) Karst.	Sur troncs morts debout de <i>Populus tremula</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Phyllactinia mali</i> (Duby) U. Braun	Parasite sur <i>Crataegus monogyna</i>	P	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Hygrophorus lindtneri</i> var. <i>carpini</i> (Grög.) Bon	Lié à un charme.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Grandinia granulosa</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Sur tronc mort de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Boisement de pin noir
<i>Melogramma bulliardii</i> Tul.	Sur tronc mort cortiqué de <i>Carpinus betulus</i> tombé au sol.	SL	Bois clair feuillus
<i>Hymenochaete corrugata</i> Fr. : Fr.	Sur bois mort encore debout de <i>Crataegus monogyna</i> ., <i>Corylus avellana</i> , <i>Buxus sempervirens</i>	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Dichomitus campestris</i> (Quél.) Dom. & Ort.	Sur bois mort debout de <i>Corylus</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Diatrypella verrucaeformis</i> (Ehrh.) Nke	Sur bois mort cortiqué de <i>Corylus</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Agrocybe semiorbicularis</i> (Bull. ex St Amans) F	Dans une pelouse à <i>Bromus erectus</i> et dans mésobromion. Prairie amendée naturellement.	S	
<i>Coprobacia granulata</i> (Bull. ex Fr.) Boud.	Saprotrophe sur crottes de moutons.	SC	Crottes de moutons
<i>Cercospora microsora</i> Sacc.	Parasite sur feuille de <i>Tilia platyphyllos</i>	P	Bois clair feuillus
<i>Hygrocybe tristis</i> (Pers.) Moeller	Dans une pelouse moussue, à proximité de buis.	S	Pelouse sèche moussue
<i>Megacystidium luridum</i> (Bres.) Boid.	Sur bois mort de <i>Cornus sanguinea</i>	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Entoloma nitidum</i> Quélet	Dans la pinède, sous <i>Pinus nigra</i> .	S	Boisement de pin noir
<i>Sistotrema confluens</i> Fr.	Sous les peupliers trembles, dans les endroits humides	SL	Bois clair feuillus
<i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quélet	Sur feuilles et brindilles.	S	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Tricholoma myomyces</i> (Pers. : Fr.) Lange	Lié à <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Pin isolé
<i>Tricholoma psammopus</i> (kalchbr.) Quélet	Dans la buxaie la plus thermophile, sous <i>P. nigra</i>	ecM	Buxaie la plus thermophile
<i>Agaricus xanthoderma</i> var. <i>lepiotoides</i> Maire	Dans les pelouses, en grandes troupes (10 à 49)	S	Pelouse sèche
<i>Microsphaeropsis concentrica</i> (Desm.) Morg. J.	Parasite sur feuilles nécrosées de <i>Buxus sempervirens</i> .	P	Fourré à buis
<i>Colletotrichum trichellum</i> (Fr. ex Fr.) Duke	Parasite sur feuilles de <i>Hedera helix</i> .	P	Bois clair feuillus
<i>Clitocybe vermicularis</i> (Fr.) Quélet	Sous <i>Pinus nigra</i> .	S	Boisement de pin noir
<i>Melanoleuca kuehneri</i> Bon	Dans les stations herbeuses des jardins et des parcs.	S	Pelouse sèche
<i>Lyophyllum fumosum</i> (Pers.: Fr.) Kühn. & Rom	Au bord d'un chemin gramineux.	S	Chemin gramineux
<i>Neolentinus adhaerens</i> (Alb. & Schw :Fr.) Redh	Sur bois enfoui de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Pin isolé
<i>Marasmius androsaceus</i> (L. : Fr.) Fr.	Dans la litière d'un bois de pins, greffé sur aiguilles de <i>Pinus nigra</i> .	S	Boisement de pin noir
<i>Hygrophorus latitabundus</i> Britz.	Sous <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Tricholoma sejunctum</i> var. <i>coniferarum</i> Bon	Sous <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Cortinarius xanthophyllus</i> (Cooke) Maire	Mycorhizique de <i>Quercus X streimi</i>	ecM	
<i>Cortinarius olivellus</i> R. Hry	Lié à un charme.	ecM	Bois clair de feuillus

<i>Cortinarius sertipes</i> Kühn.	Lié à un charme	ecM	bois clair de feuillus
<i>Trichoglossum hirsutum</i> (Persoon ex Fr.) Boudi	A l'intérieur d'un buisson de buis	S	Fourré à buis
<i>Phellodon niger</i> (Fr. : Fr.) Karsten	Sous <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Hygrocybe chlorophana</i> var. <i>aurantiaca</i> Bon	Dans les pelouses naturelles. Prairie pâturée occasionnellement.	S	Pelouse semée fin 2002
<i>Galerina hypnorum</i> (Shrank : Fr.) Kühner	Parmi les mousses, dans une formation à <i>Cornus sanguinea</i> et <i>Viburnum lantana</i>	Mo	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Inocybe sindonia</i> (Fr.) P. Karsten	Sous noisetiers.	ecM	bois clair de feuillus
<i>Vuilleminia cystidiata</i> Parm.	Sur <i>Prunus spinosa</i> , <i>Crataegus monogyna</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Puccinia punctata</i> LK. s. str.	Parasite sur <i>Galium album</i> , stades II	P	
<i>Fumalia trogii</i> (Berk.) Bond. & Sing.	Sur branches mortes de <i>Salix caprea</i> .	SL	bois clair de feuillus
<i>Botryobasidium candicans</i> Erikss.	Sur branchette morte de <i>Viburnum lantana</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Hygrocybe reae</i> (Maire) Lange	Sous les buissons de buis	S	Fourré à buis
<i>Hygrocybe cinereifolia</i> Courtecuisse & Prion	Dans la pelouse sèche.	S	Pelouse sèche
<i>Tubaria conspersa</i> (Pers. : Fr.) Fayod	Sur brindilles enfouies.	SL	Pelouse artificielle
<i>Entoloma sericellum</i> (Fr. : Fr.) Kumm.	En lisière d'un buisson, sous <i>Corylus</i> .	S	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Entoloma serrulatum</i> (Fr. : Fr.) Hes.	Dans la pelouse hors buis	S	
<i>Hemimycena lactea</i> (Pers. : Fr.) Sing.	Dans une pinède à <i>Pinus nigra</i> , saprotrophe des aiguilles.	S	Boisement de pin noir
<i>Mycena adscendens</i> (Lasch.) M. Geest.	Sur brindilles enfouies, en lisière d'un buisson.	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Stropharia albonitens</i> (Fr.) Karst.	Dans une pelouse pâturée par les moutons.	S	Pelouse pâturée
<i>Marssonina juglandis</i> (Lib.) Magn.	Parasite sur feuilles de <i>Juglans regia</i> .	P	Bois clair feuillus
<i>Oxyporus populinus</i> (Schum. : Fr.) Donk	Parasite de blessure, sur <i>Euonymus europaeus</i> .	SL	Bois clair feuillus
<i>Peziza echinospora</i> P. Karsten = <i>Aleuria umbrina</i>	Sur une place à feu partiellement envahie de funaires.	S	Place à feu
<i>Grandinia nesporei</i> (Bres.) Cejp	Sur branchette morte décortiquée de <i>Crataegus monogyna</i> ., de <i>Corylus avellana</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Hyaloscypha hyalina</i> (Pers.) Boud.	Sur branches tombées de <i>Crataegus monogyna</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Phanerochaete sordida</i> (Karst.) Erikss. & Ryv.	Sur bois mort de <i>Buxus sempervirens</i>	SL	Fourré à buis
<i>Cylindrobasidium evolvens</i> (Fr.) Jülich	Sur écorce de <i>Pinus nigra</i> mort encore debout.	SL	Boisement de pin noir
<i>Conocybe siennophylla</i> (Berk & Broo.) Sing.	Dans la pelouse sommitale, sur sol enrichi par des excréments de bovins,	S	Pelouse sèche pâturée
<i>Mycena pseudopicta</i> (Lange) Kühner	Dans la pelouse sèche moussue.	S	pelouse sèche moussue
<i>Cercospora circumscissa</i> Sacc.	Parasite sur feuilles de <i>Prunus avium</i>	P	Bois clair feuillus
<i>Cystoderma superbum</i> Huijsman	Dans une buxaie, dans la litière de feuilles	S	Fourré à buis
<i>Cortinarius arenatus</i> (Fr.) Fries	Lié à <i>Pinus nigra</i> .	ecM	Boisement de pin noir
<i>Skeletocutis amorpha</i> (Fr.) Kotl. & Pouz.	Sur bois mort de <i>Pinus nigra</i> et de <i>Carpinus betulus</i>	SL	Boisement de pin noir
<i>Russula torulosa</i> Bresadola	Sous <i>Pinus nigra</i> - Sous <i>P. sylvestris</i>	ecM	Boisement de pin noir
<i>Cortinarius vagnetii</i> R. Hry	Dans les bois de feuillus mêlés de quelques conifères, le 20/9/84, le 28/9/88 et le 10/10/99	ecM	Bois clair feuillus

<i>Puccinia graminis</i> Pers. ssp. <i>graminis</i> s. Cummi	Parasite sur Berberis vulgaris (stade S et I), dans une lavière	P	Lavière
<i>Peniophora pithya</i> (Pers.) Erikss.	Sur bois mort cortiqué de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Boisement de pin noir
<i>Floccularia luteovirens</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Gil	Dans les pelouses sèches calcaires thermophiles.	S	Frotey le 20/10/1956, dans le
<i>Grandinia barba-jovis</i> (Fr.) Jülich	Sur bois mort de Viburnum lantana	SL	Fourré (Prunetalia)
<i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch) Bon	Dans la litière d' une chênaie fraîche mêlée de quelques hêtres. Litière d'aiguilles, sous P. nigra.	S	Bois clair feuillus
<i>Mycena hiemalis</i> (Osbeck) Quélet	Sur écorce moussue de P. nigra.	S	Boisement de pin noir
<i>Mycena olida</i> Bres.	Sur branchette cortiquée de feuillu.	SL	Bois clair feuillus
<i>Phaeotellus griseopallidus</i> (Desm.) Kühn. & Lar	Dans les cailloux du sentier, au Sud de la réserve, près d'une haie de prunelliers, en situation héli	S	
<i>Orbilina xanthostigma</i> (Fr.) Fr.	Sur tronc de <i>Pinus nigra</i> au sol et assez dégradé.	SL	Boisement de pin noir
<i>Peniophora rufomarginata</i> (Pers.)	Sur branchette morte de <i>Tilia cordata</i> .	SL	Arbre isolé dans pelouse
<i>Crepidotus subverrucisporus</i> Pilat	Sur bois mort de <i>Cornus sanguinea</i> .	SL	Fourré (Prunetalia)
<i>Hysterium angustatum</i> Alb. & Schw.	Sur tige morte cortiquée de Rosa canina	SL	Fourré (Prunetalia)
<i>Eutypa flavovirens</i> (Pers. ex Fr.) Tul.	Sur branches mortes et cortiquées de Corylus avellana.	SL	Bois clair feuillus
<i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck	Sous Pinus nigra	ecM	Boisement de pin noir
<i>Conocybe lactea</i> (Lge) Métr.	Dans une pelouse pâturée par les moutons.	S	Pelouse pâturée
<i>Camarophyllopsis foetens</i> (Phill.) Arnolds	Sous les buis, dans la litière de feuilles de buis.	S	Fourré à buis
<i>Melanoleuca pseudorasilis</i> (Bon) B.	Sous Pinus nigra, près d'un massif de buis	S	Pin isolé dans pelouse
<i>Cinereomyces lindbladii</i> (Berk.) Jül.	Sur bois mort cortiqué de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Boisement de pin noir
<i>Skeletocutis carneogrisea</i> David	Sur le fût d'un <i>Pinus nigra</i> tombé au sol et déjà très décomposé.	SL	Boisement de pin noir
<i>Dendrothele alliacea</i> (Quél.) Lemke	Sur écorce des troncs vivants de buis.	P	Fourré à buis
<i>Geoglossum cookeianum</i> Nannfeldt	Dans un massif de buis.	S	Fourré à buis
<i>Hygrocybe ortoniana</i> Bon	Dans une pelouse moussue, en lisière d'une formation à <i>Buxus sempervirens</i> .	S	Pelouse moussue
<i>Cortinarius parherpeticus</i> ss. Bidaud	Sous noisetier.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Coprinus ephemerus</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Sur sol fumé par des crottes de moutons.	S	Pelouse fumée
<i>Trichaptum fuscoviolaceum</i> (Ehrenb. ex Fr.) Ry	Sur bois mort de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Boisement de pin noir
<i>Hemitrichia serpula</i> (Scop.) Rostf.	Sur bois pourrissant de Carpinus betulus.	S	Bois clair feuillus
<i>Cortinarius azureovelatus</i> P. D. Orton	Sous Rhamnus cathartica et Quercus petraea	ecM	Bois clair feuillus
<i>Basidioidendron cesiocinereum</i> (v. Höhn & Lits	Sur tige morte de Rosa canina	SL	Fourré (Prunetalia)
<i>Clavulinopsis laeticolor</i> (Berk. & Curt.) Petersen	En lisière de pinède, parmi les mousses, sous Pinus nigra - Dans un massif de buis, parmi de peti	S	Boisement de pin noir
<i>Clitocybe collina</i> (Velen.) Klan	En rond de sorcière dans la pelouse sèche, dans le parc à mouton.	S	Pelouse sèche
<i>Cortinarius intermedius</i> Hry	Sous Carpinus betulus.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Clitocybe gyrans</i> (Paul. ex Fr.) Gill.	Dans une pelouse amendée.	S	Pelouse amendée
<i>Mycena ammoniaca</i> (Fr.) Quélet	Dans une pelouse sèche.	S	Pelouse sèche

<i>Cuphophyllus cereopallidus</i> (Clemç) Bon	Dans la pelouse sèche, près d'un massif de buis.	S	Pelouse sèche
<i>Entoloma carneigriseum</i> (Berk. & Br.) Noordel.	Dans une lisière herbeuse.	S	Lisière herbeuse de pinède
<i>Entoloma longistriatum</i> (Peck) Noordel.	Dans une pelouse sèche avec buis à proximité.	S	Pelouse sèche
<i>Hygrocybe calciphila</i> Arnolds	Dans une pelouses calcaire, parmi les mousses, près de <i>Buxus sempervirens</i> , sous <i>P. nigra</i>	S	Pelouse sèche
<i>Hygrocybe conica</i> var. <i>chloroides</i> (Malençon) M	Dans les pelouses ou prés-bois plus ou moins acides.	S	Pelouse
<i>Hygrocybe persistens</i> var. <i>langei</i> (Kühner) Bon	Surtout dans les pelouses sèches calcaires bien exposées.	S	Pelouse sèche
<i>Hyphoderma praetermissum</i> (P. Karsten) J.Erik	Sur une branchette décortiquée de <i>Viburnum lantana</i> .	SL	Fourré (Prunetalia)
<i>Lepiota josserandii</i> M. Bon & Boiffard	Sous buis	S	Fourré à buis
<i>Ramaria gracilis</i> (Fr.) Quéf.	Sous Pinus nigra, en relation avec du bois mort enterré.	SL	Boisement de pin noir
<i>Russula sanguinaria</i> var. <i>confusa</i> (Vel.) Melz.	Sous Pinus nigra, dans un parc à chevaux	ecM	Parc à chevaux
<i>Galerina laevis</i> (Pers.) Sing.	Dans les pelouses, de l'étage planitiaire à l'étage subalpin.	S	Pelouse
<i>Cortinarius candularis</i> (Fr.) Fr.	Sous un charme.	ecM	Bois clair feuillus
<i>Melanoleuca graminicola</i> (Vel.) Kühner & Mai	Parmi les graminées, dans les pelouses sèches exposées au sud. et dans la pelouse sommitale.	S	Pelouses sèches exp sud
<i>Lycoperdon lividum</i> Pers.	Dans les pelouses sèches, aux endroits chauds - Près d'un massif de buis dans une pelouse xéro-	S	Pelouse sèche
<i>Mycena galopus</i> var. <i>alba</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Dans la litière, sous Pinus nigra.	S	Boisement de pin noir
<i>Peniophora nuda</i> (Fr. : Fr.) Bresadola	Sur branches morte de <i>Viburnum lantana</i> .	SL	Fourré (Prunetalia)
<i>Hygrophorus hedrychii</i> (Vel.) Kult	Sous un jeune <i>Betula pendula</i> .	ecM	Bois clair de feuillus
<i>Stropharia melasperma</i> (Bull. : Fr.) Gillet	Dans une pelouse pâturée par les moutons.	S	Pelouse pâturée
<i>Boletus luridus</i> var. <i>queletiformis</i> Blum	Sous Pinus nigra.	ecM	ous pin isolé, dans une pelous
<i>Leucoagaricus cinerascens</i> (Quéf.) M. Bon & B	Dans les pelouses sèches arénacées, parfois dunes fixées.	S	Pelouses sèches
<i>Tubaria romagnesiana</i> Arnolds	Greffé à la base de brins de mousse, dans la pelouse sèche moussue	Mo	Pelouse sèche moussue
<i>Agaricus campestris</i> var. <i>squamulosus</i> Pilat	Dans la pelouse sèche.	S	Pelouse sèche
<i>Hygrocybe paraceracea</i> Bon	Dans une pelouse moussue en lisière de pinède à Pinus nigra. Chapeau et stipe d'aspect cireux, à peine lubrifiés, d'un beau jauf vif lumineux uniforme. Chapeau jusqu'à 4,5 cm de diamètre, stipe 5-7 x 0,6 - 0,8 cm. Hygrocybe proche de ceracea mais dimensions supérieures.	S	Pelouse sèche
<i>Grandinia arguta</i> (Burt.) Jül.	Sur bois mort de <i>Crataegus monogyna</i>	SL	Fourré (Prunetalia)
<i>Conocybe pseudopilosella</i> Kühn. & Watl.	Dans une pelouse, en lisière de buisson.	S	Pelouse
<i>Entoloma juncinum</i> (Kühn. & Romagn.) Noord	En bordure d'une ancienne place à feu, parmi les graminées, saprotrophe de l'humus,	S	Pelouse, bordure place à feu
<i>Flammulaster carpophilus</i> (Fr.) Earle	Dans la litière de feuilles de noisetier.	S	Bois clair de feuillus
<i>Septoria ebuli</i> Desm. & Rab.	Parasite sur <i>Sambucus ebulus</i>	P	Bord chemin, lisière pelouse
<i>Cortinarius trivialis</i> Lge. var. <i>rickeni</i> Hy.	Sous Pinus nigra.	ecM	Boisement de pins
<i>Cortinarius urbicus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Sous <i>Corylus</i>	ecM	Bois clair de feuillus
<i>Entoloma pseudoturci</i> Noordeloos	Autour des buissons de buis.	S	Dans pelouse, autour des buis
<i>Entoloma sericeoides</i> (J. Lange) Noordeloos	Dans la pelouse, sous <i>Carpinus betulus</i> .	S	

<i>Microsphaera hedwigii</i> Lév.	Parasite sur des plantules de <i>Viburnum lantana</i> .	P	Fourré (Prunetalia)
<i>Entoloma papillatum</i> (Bres.) Dennis	Dans une prairie non amendée - parmi les mousses, près de buis.	S	Fourré (Prunetalia)
<i>Crepidotus epibryus</i> (Fr.) Quélet = <i>Pleurotellus</i>	Sur une ramille de feuillu.	SL	Bois clair de feuillus
<i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th. Fr.	Sur branchette de <i>Viburnum lantana</i> - Nitrophile.	S	Fourré (Prunetalia)
<i>Calvatia excipuliformis</i> f. <i>capitata</i> (Hollos) Kre	Dans une pinède, sous <i>Pinus nigra</i> - Surtout en plaine.	S	Boisement de pins
<i>Antrodia macra</i> (Sommerf.) Niemelä	Sur branche morte de <i>Viburnum lantana</i>	SL	Fourré (Prunetalia)
<i>Mycosphaerella buxicola</i> (DC.) Tomilin	Parasite sur feuilles de <i>Buxus sempervirens</i> .	P	Fourré à buis
<i>Psathyrella clivensis</i> (Berk. & Broome) P.D. Or	Dans une pelouse xérophile.	S	Pelouse xérophile
<i>Cladonia rangiformis</i> Hoffm.	Terricole dans les pelouses sèches calcaires.	S	Pelouse sèche
<i>Athelopsis lacerata</i> (Litsch.) J. Erikss. & Ryvard	Sur branche tombée à terre de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Boisement de pins
<i>Agaricus xanthodermus</i> Genevier var. <i>melaegro</i>	Dans la pelouse sèche, parfois sous <i>Buxus sempervirens</i> .	S	Pelouse sèche
<i>Mycena nucicola</i> Huijsman	Sur coquilles mortes de noisettes enterées	S	Bois clair de feuillus
<i>Hyphoderma mutatum</i> (Peck) Donk	Sur écorce d'Acer campestre (érable champêtre), sur <i>Populus tremula</i> ,	SL	
<i>Phyllosticta ligustri</i> Sacc.	Parasite sur <i>Ligustrum</i> .	P	Fourré (Prunetalia)
<i>Coprinus marculentus</i> Britzelm.	Sur fumier de bovin paillé.	SC	Fumier de bovins paillé
<i>Russula teneropus</i> Romagn.	Sous <i>Populus tremula</i> .	ecM	Fourré (Prunetalia)
<i>Fuligo leviderma</i> H. Neubert, Nowotny & K. Ba	Sur bois mort humide déjà très décomposé de <i>P. nigra</i> (cime cassée ne touchant pas le sol)	S	Boisement de pin noir
<i>Lepista fasciculata</i> Harmaja	Au bord d'un sentier, sous <i>Pinus nigra</i> , parmi les graminées, près de buis, en touffe de 10 spécimens connés. Ressemble à <i>Lepista panaeolus</i> mais pousse en touffe. Chapeau 3-6 cm, brun pâle, à marge nettement enroulée. Lames courtement mais nettement décurrentes. Stipe 50-80 x 8-15 mm, blanchâtre rayé de fibrilles gris pâle. Saveur douce, odeur faible, agréable.	S	
<i>Phoma hedericola</i> (Durieu & Mont.) Boerema	Parasite sur feuilles de <i>Hedera helix</i> , sous un <i>Robinia pseudoacacia</i> .	P	
<i>Microthyrium macrosporum</i> (Sacc.) Höhn.	saprophyte sur feuilles de <i>Buxus sempervirens</i> .	S	Fourré à buis
<i>Psathyrella phegophila</i> Romagn.	Sur la terre nue, sous <i>Populus tremula</i> .	S	
<i>Lamproderma atrosporum</i> var. <i>atrosporum</i> M	Sur troncs morts de <i>Pinus nigra</i> très dégradés et très humides.	S	Boisement de pin noir
<i>Phyllosticta sphingina</i> Bubák	Parasite sur feuilles de <i>Buxus sempervirens</i> .	P	Fourré à buis
<i>Peniophora proxima</i> Bres.	Sur branches mortes ou troncs secs sur pied de <i>Buxus sempervirens</i> .	SL	Fourré à buis
<i>Antrodia ramentacea</i> (Berk. & Broome) Donk	Sur l'écorce d'une souche de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Pin isolé dans pelouse
<i>Scytinostroma odoratum</i> (Fr.) Donk	Sur bois mort de <i>Pinus nigra</i> - sur l'écorce d'une souche de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Pin isolé dans pelouse
<i>Phyllosticta digitalis</i> Bellyneck	Parasite sur feuilles de <i>Digitalis lutea</i> .	P	Dans une lavière
<i>Phyllosticta badhamii</i> Cooke	Parasite sur feuilles de <i>Vitis vinifera</i> .	P	
<i>Septoria digitalis</i> Pass.	Parasite sur feuilles de <i>Digitalis lutea</i> .	P	
<i>Ascochyta coluteae</i> F. Lamb. & Fautrey	Parasite sur feuilles de <i>Colutea arborescens</i> .	P	Sur la corniche
<i>Phellinus ribis</i> f. <i>crataegi</i> (Bourdot & Galzin) P	Parasite sur <i>Crataegus monogyna</i> dans un bois clair de feuillus.	P	Bois clair de feuillus

<i>Cortinarius vaginatopus</i> Bidaud, Moëgne-Loce	Mycorhizique d'un chêne. Sous charme.	ecM	Lisière bois clair de feuillus
<i>Entoloma infula</i> var. <i>chlorinosum</i> (Arnolds & I	Dans une pelouse sèche fauchée.	S	Pelouse sèche fauchée
<i>Mucilago crustacea</i> P. Micheli ex F.H. Wigg.	Sur une tige sèche de Poaceae (graminée)	S	
<i>Entoloma poliopus</i> (Romagn.) Noordel.	Dans la pelouse sèche	S	Pelouse sèche
<i>Skeletocutis nivea</i> (Jungh.) Jean Keller	Sur bois mort de <i>Corylus</i> . Sur branche morte de <i>Pinus nigra</i> .	SL	Bois clair de feuillus
<i>Galerina badipes</i> (Fr.) Kühner	Sur débris ligneux de <i>P. nigra</i> , dans le corridor entre pelouses - Dans un massif de buis.	SL	Pin isolé
<i>Clitocybe phaeophthalma</i> var. <i>gibboides</i> (Raith	Sous trembles et noisetiers, parmi les mousses humides	S	Bois clairs de feuillus
<i>Clitocybe senilis</i> (Fr.) Gillet	concentriquement, à cuticule soyeuse et marge fissile. Lames arquées-décurrentes. Stipe cartilagineux, subconcolore. Chair pâle à odeur forte d'huile rance, comme celle de <i>macrocystidia cucumis</i> .	S	Pelouse sèche
<i>Limacella illinita</i> var. <i>ochraceolutea</i> (P.D. Orton	Au pied d'un <i>Pinus nigra</i> mais à proximité d'un chêne, près du sabot, dans une station thermophi	ecM	Près de la corniche
<i>Galerina atkinsoniana</i> A.H. Sm.	Dans un massif de buis - Dans la pelouse moussue.	S	Fourré à buis
<i>Entoloma sericeum</i> var. <i>cinereo-opacum</i> Noordel.	Dans une pelouse sèche moussue, près d'un massif de buis.	S	Pelouse sèche
<i>Skeletocutis subincarnata</i> (Peck) Jean Keller	Sur bois mort de <i>Prunus spinosa</i> .	SL	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Chlorosecypha sabinae</i> (Fuckel) Dennis	Sur aiguilles mortes encore sur les rameaux de <i>Juniperus communis</i> .	S	Juniperus dans pelouse
<i>Hyponectria buxi</i> (DC.) Sacc.	Parasite sur feuilles de <i>Buxus sempervirens</i> dans un massif de buis.	P	Fourré à buis
<i>Phyllosticta himantoglossi</i> Petr.	Parasite sur <i>Himantoglossum hircinum</i> .	P	
<i>Phyllosticta rubicola</i> Rabenh.	Parasite sur <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	P	Fourré (<i>Prunetalia</i>)
<i>Galerina cinctula</i> P.D. Orton	Parmi les mousses du genre <i>Dicranum</i> , sous <i>P. nigra</i> .	Mo	Pin isolé dans pelouse
<i>Cercospora ononidicola</i> Unamuno, (1921)	Parasite sur <i>Ononis spinosa</i> var. <i>procurrens</i>	P	Pelouse sèche
<i>Athelia fibulata</i> M.P. Christ.	Sur tronc mort de <i>Pinus nigra</i> tombé au sol.	SL	Boisement de pins noirs
<i>Galerina cerina</i> f. <i>cerina</i> A.H. Sm. & Singer	Sous <i>Carpinus</i> .	S	Bois clair de feuillus
<i>Uromyces valerianae</i> Fuckel Stade II	Parasite sur <i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>repens</i>	P	Lisière herbeuse
<i>Uromyces trifolii-repentis</i> var. <i>fallens</i> (Arthur)	Sur <i>Trifolium medium</i>	P	
<i>Inocybe catalaunica</i> Singer = <i>I. leiocephala</i>	Sous <i>Pinus nigra</i>	ecM	Boisement de pins noirs
<i>Galerina vittiformis</i> var. <i>pachyspora</i> A.H. Sm.	Associée à des mousses, dans pelouse parc à chevaux	Mo	Pâture à chevaux
<i>Psilocybe subcoprophila</i> (Britzelm.) Sacc.	Près d'un tas de crotin de cheval	SC	Pâture à chevaux
<i>Cuphophyllus cereopallidus</i> f. <i>bisporiger</i> Bon	Dans la pelouse sèche	S	
<i>Clonostachys buxi</i> (J.C. Schmidt ex Link) Schro	Sur feuilles sèches de <i>Buxus sempervirens</i> .	S	Fourré à buis
<i>Phomopsis stictica</i> (Berk. & Broome) Traverso	Sur rameaux secs de <i>Buxus sempervirens</i> .	SL	Fourré à buis
<i>Dermoloma</i> sp.	1 ex. dans les buis - Coordonnées GPS : 32 288509E /5278802N alt.306m	S	

s pelouses xérophiles.

se

3

ses

clair